



J.U. Opća bolnica  
"Prim.dr. Abdullah Nakaš"  
Sarajevo



# BRIGA ZA MAJČINO ZDRAVLJE

Sarajevo, 12.11.2014.

Autor: Mr. sci. dr. Mirza Kozarić  
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo

# Ishrana majke dojilje

- ▶ Sve majke moraju jesti i piti dovoljno kako bi se dobro osjećale i mogle brinuti za svoju obitelj.
- ▶ Majke ne moraju jesti posebnu hranu niti izbjegavati određenu hranu dok doje.
- ▶ Ako su zalihe hrane ograničene, za zdravlje i prehranu majke i djeteta je bolje davati hranu majci kako bi se mogla brinuti za dijete nego davati djetetu umjetnu hranu.

# Kontracepcijska metoda laktacijske amenoreje

- ▶ U 98 % slučajeva učinkovita je kontracepcijska metoda ako:
  - Majka nema menstruaciju
  - Majka isključivo doji i danju i noću uz mali razmak između podoja
  - Dijete je mlađe od 6 mjeseci

*Kontracepcijske tablete koje sadrže estrogen nisu pogodne za dojilje.*

# Dojenje u slučaju bolesti majke

- ▶ Žene mogu nastaviti dojiti u gotovo svim slučajevima kada su bolesne

## Prednosti dojenja:

- ▶ Majčino tijelo sadrži
  - Antitijela-> mlijeko-> novorođenče
  - Zaštita zdravlja
  - Optimalan rast i razvoj
  - Manji rizik od pretilosti
- ▶ Dojenje je jednostavniji način prehrane od umjetne ishrane novorođenčeta

# Kako podržati dojenje kod bolesne majke?

- ▶ Objasniti vrijednost nastavljanja dojenja
- ▶ Smanjiti odvojenost majke i djeteta
- ▶ Dovoljan unos tečnosti
- ▶ Pomoć majki da se udobno smjesti za dojenje
- ▶ Ako se majka loše osjeća, preporuka je izdajati mlijeko i hraniti dojenče majčinim mlijekom
- ▶ Odabir lijekova koji nisu opasni za dojenje.

# Kako podržati dojenje kod bolesne majke?

- ▶ Hospitalizacija ne predstavlja kontraindikaciju za dojenje.
- ▶ Ovisnost majke (duhan, alkohol, lake droge) ne predstavljaju kontraindikacije za dojenje.
- ▶ Dojenje se ne preporučuje ovisnicama o intravenskim drogama.
- ▶ Kod uobičajenih zaraznih bolesti poput respiratorne infekcije, grlobolje ili infekcije GI trakta postoji veći rizik od infekcije ako dijete ne doji-
- ▶ Ako majka ne doji, preporučiti zamjensku dojilju (banka majčinog mlijeka).

# Preporuke UNICEF-a/SZO za dojenje HIV pozitivnih majki

- ▶ Kada je zamjensko dojenje dostupno, izvedivo, finansijski moguće, održivo i sigurno, preporučuje se svim HIV pozitivnim majkama da izbjegavaju dojenje.
- ▶ U suprotnom, isključivo dojenje, dojenje kao jedinini način prehrane preporučuje se tijekom prvih šest mjeseci života, nakon čega bi trebalo biti prekinuto.

# Zarazne bolesti majke

- ▶ Absces dojke – dojenje se ne preporučuje na bolesnoj dojci
  - Dojenje nastaviti kada se izvrši drenaža i započne liječenje antibioticima
- ▶ HSV-1 – dojenje se ne preporučuje dok se lezije ne povuku
- ▶ Vodene kozice/Herpes zoster– dojenje se ne preporučuje.

# Dojenje nije kontraindicirano u slučaju sljedećih bolesti majke

- ▶ **Hepatitis B** – novorođenče bi trebalo primiti cjepivo protiv Hepatitisa B prvih 48h
- ▶ **Tuberkuloza** – majke bi trebale normalno nastaviti dojenje i liječenje u skladu sa nacionalnim smijernicama za liječenje tuberkuloze
- ▶ **Mastitis** – općenito tokom terapije antibioticima preporučuje se nastavak dojenja

\*[www.who.int/child-adolescent-health/publications/pubnutrition.htm](http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/pubnutrition.htm)

# Lijekovi i dojenje

- ▶ Većina lijekova dospijeva u majčino mlijeko u malim količinama.
- ▶ U većini slučajeva prestanak dojenja može biti opasnije za dijete od samog lijeka.

- ▶ **Dojenje je kontraindicirano** ako majka uzma:
  - Lijekove protiv raka (citostatici)
  - Radioaktivne tvari (privremeno prekinuti dojenje)
- ▶ **Koristite alternativne lijekove** ako je moguće:
  - Hloramfenikol, tetraciklini, metronidazol, konolonski antibiotici (ciprofloksacin)
- ▶ **Pratite dijete zbog žutice**
  - Sulfonamidi, dapson, sulfametoksazol+timetroprim
- ▶ **Koristite alternativni lijek (može smanjiti količinu mlijeka):**
  - Estrogeni, kontacepcijske pilule koje sadrže estrogen, tijazidski diuretici, ergometrin
- ▶ **Pratite moguće nuspojave, pospanost djeteta**
  - Psihijatrijski lijekovi, antikonvulzivi

# Lijekovi i dojenje

- ▶ **Sigurni u uobičajenim dozama:**
- ▶ Analgetici i antipyretici (kratko uzimanje)
  - (paracetamol, acetilsalicilna kiselina)
- ▶ Antibiotici
  - Ampicilin, amoksicilin, kloksacilin, penicilini, eritromicin
- ▶ Tuberkulostatici
- ▶ Lijekovi protiv malarije (osim mefloquina, Fansidar)
- ▶ Bronhodilatatori (npr. Salbutamol), kortikosteroidi, antihistaminici
- ▶ Antacidi, lijekovi za DM, većina antihipertenziva
- ▶ Prehrambeni dodaci– jod, željezo, vitaminii

**Provjeriti sigurnost lijeka na popisu SZO**

\* [www.who.int/child-adolescent-health/](http://www.who.int/child-adolescent-health/)

# HVALA!