



ABDULAH NAKAŠ
OPĆA BOLNICA

HAEMORRHAGIA POST TONSILLECTOMIAM KOD DJECE I ODRASLIH


VAŽNOST POSTOPERATIVNOG TONZILARNOG KRVARENJE
I ULOGA MEDICINSKE SESTRE

MT ALMA ČELIK

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
Odsjek za ORL – Odjeljenje za hirurgiju

SARAJEVO, APRIL 2017.

- Krvarenje poslije operacije krajnika je veoma opasno stanje i mora biti shvaćeno krajnje ozbiljno.
- Iako su iznimno rijetka, dešavala su se postoperativna krvarenja poslije operacije krajnika sa smrtnim ishodom.
- Krvarenja poslije operacije krajnika javljaju se u oko 2-5 % slučajeva. U oko 20 % od tih slučajeva potrebno je hirurško zbrinjavanje u operacionoj sali u općoj anesteziji.
- Najčešće je spontano.
- Češće se javlja kod odraslih i obilnije je.



Podjela

PRIMARNA - Rana krvarenja se javlja u prva 24 sata poslije operacije i zato je nadzor nad pacijentom strožiji.

SEKUNDARNA - Kasna krvarenja se mogu javiti u bilo kojem periodu, a najčešća su oko sedmog postoperativnog dana kada fiziološki dolazi do spadanja fibrinskih nasлага koje prekrivaju tonsilarne lože s kojih su odstranjene tonzile. Zabilježeni su slučajevi post operativnog krvarenja i dvije sedmice nakon operacije.

Uzroci

- Urođena sklonost organizma ka krvarenju.
- Nepridržavanje uputa o higijensko-dijetetskom režimu i mirovanju
- Neuzimanje preporučene antibiotske terapije
- Infekcija
- Ostalo

Prevencija

- Upoznati pacijenta ili roditelje o pravilnom ponašanju poslije operacije krajnika /Higijensko-dijetetski režim/. Kašasta i tečna ishrana, izbjegavati čvrstu hranu kao i tečnu sa čvrstim komadićima, izbjegavati hranu koja se može zalićiti za rane, tj. fibrinske naslage u tonsiranim ložama. Izbjegavati toplu hranu i napitke, gazirana pića i začine.
- Mirovanje
- Antibiotička profilaksa i analgezija
- Upoznati pacijenta o postojanju mogućnosti postoperativnog krvarenja te što učiniti ako se ono desi /sjedeći položaj, hladan oblog oko vrata, odmah se javiti u zdravstvenu ustanovu/.

Šta uraditi ? Uloga medicinske sestre

- Staviti pacijenta u sjedeći položaj i objasniti da krv mora ispljuvavati.
- Postaviti pacijentu hladan oblog oko vrata
- Pripremiti aspirator
- Smiriti pacijenta riječima jer je ova situacija vrlo stresno za pacijenta i pratinju
- Pripremiti i.v. put radi eventualne transfuzije
- Pripremiti sterilne instrumente uključujući i termokauter
- Pripremiti lokalni anestetik
- Pripremiti analgetik
- Obavijestiti anesteziologa, operaciona sala mora biti na dispoziciji
- Opervirati vitalne znakove i hemodinamski status /tjelesna temperatura, puls, pritisak, hematokrit, hemoglobin, trombociti.../
- Po zaustavljanju krvarenja pacijenta se može postaviti u ležeći položaj na bok s glavom i ustima prema dole
- Opervacija pacijenta po zaustavljanju krvarenja



Zaključak

- Krvarenje poslije operacije krajnika (Haemorrhagia post tonsillectomiam) je rijetko ali iznimno opasno stanje.
- Prevencija ima značajnu ulogu u smanjenju broja slučajeva.
- Zbrinjavanju pacijenta treba se pristupiti odmah.
- Medicinska sestra i ljekar moraju imati dobru koordinaciju i djelovati kao tim.
- Po zaustavljanju krvarenja neophoda je opservacija pacijenta.

Hvala na pažnji !